

Grypa ptaków (HPAI)

Niebezpieczna choroba ptaków zwalczana z urzędu

Grypa ptaków jest chorobą wirusową, która dotyka w głównej mierze ptaki- zarówno drób jak i ptaki dzikie. Zakażenia ptaków mogą być wywoływane przez wirusy grypy wysoce zjadliwej (ang. Highly Pathogenic Avian Influenza) oraz wirusy o niskiej zjadliwości (ang. Low Pathogenic Avian Influenza). Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych **zasadach bioasekuracji** jakie trzeba przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wirusa:

- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu;
- zabezpieczyć paszę i wodę do pojenia drobiu przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty regularnie nasączone aktywnym środkiem dezynfekcyjnym w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) mogące wystąpić u drobiu to m.in.

- osowiałość,
- gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj,
- pojawienie się objawów nerwowych,
- zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonek,
- silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność,
- biegunka.

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność wśród ptaków może dochodzić do 100%.

Należy niezwłocznie zgłaszać każdy przypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (np. nagłe zwiększone padnięcia drobiu) do odpowiednich osób i instytucji (powiatowy lekarz weterynarii, lekarz weterynarii prywatnej praktyki, wójt/burmistrz/prezydent miasta).

W przypadku stwierdzenia chorób zwalczanych z urzędu o Inspekcja Weterynaryjna podejmuje działania urzędowym podejmuje działania w celu zwalczania choroby.

Rzekomy pomór drobiu (ND — Newcastle Disease)

Niebezpieczna choroba ptaków zwalczana z urzędu

Może przebiegać z bardzo dużą śmiertelnością, w przeciągu 3-4 dni od wstąpienia objawów klinicznych. Jest to jedna z najbardziej powszechnych i wysoce zaraźliwych chorób układu oddechowego, na którą narażone są ptaki w każdym wieku — zarówno hodowlane jak i dzikie. Śmiertelność u zakażonych zwierząt może dochodzić nawet do 100%.

Typowe objawy kliniczne rzekomego pomoru drobiu:

- Utrudnione oddychanie;
- Zasinienie grzebieni;
- Rzężenia i charczenia, którym towarzyszą objawy nerwowe, takie jak porażenia czy skręty szyi;
- Produkcja nieśna spada od 30 do 50% lub więcej i powraca do normy po około 2 tygodniach.
Jaja mogą mieć cienką skorupę, typowe jest również składanie jaj bez skorup (tzw. „lanie jaj” — jaj w błonach).

Przenoszona jest drogą kropelkową. Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt z wydzieliną zapalną, np. podczas korzystania z jednego poidła lub karmnika, do którego dostęp miało zakażone zwierzę. Odchody chorych ptaków zawierające wirus zanieczyszczają paszę, wodę i otoczenie, stanowiąc źródło zakażenia. Środki dezynfekujące łatwo niszczą wirus, ale w ściółce może on zachować żywotność nawet przez 2 miesiące, a w padłych ptakach — nawet przez 12 miesięcy. Okres inkubacji choroby trwa od 2 do 15 dni.

Każdy posiadacz drobiu, powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii powiatowy lekarz weterynarii, lekarz weterynarii prywatnej praktyki, wójta/burmistrza/prezydent miasta o wstąpieniu podejrzenia choroby u drobiu na co mogą wskazywać następujące objawy kliniczne:

- Zwiększona śmiertelność;
- Znaczący spadek pobierania paszy i wody;
- Objawy nerwowe, takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu;
- Duszność;
- Sinica i wybroczyny;
- Nagły spadek nieśności.

Zwalczanie rzekomego pomoru drobiu

Rzekomy pomór drobiu nie podlega leczeniu. Jest to choroba zwalczana z urzędu. Następuje likwidacja stada oraz jego utylizacja. Należy wówczas usunąć wszystkie przedmioty, z którymi ptaki miały kontakt oraz dokonać dokładnej dezynfekcji pomieszczeń oraz urządzeń. Osoby utrzymujące drób w chowie przyzagrodowym, nie powinny być zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

Spełnienie zasad bioasekuracji (załącznik do pisma) przez hodowców drobiu przyzagrodowego, w przypadku wystąpienia choroby — rzekomego pomoru drobiu jest warunkiem wypłacenia odszkodowania ze Skarbu Państwa w związku z likwidacją ogniska.

Podstawowe zasady bioasekuracji stad drobiu – takie same jak przy grypie ptaków HPAI.